

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора  
И.А. ВЛАСОВ  
03.10.2016



## ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата Мадикокс<sup>®</sup> для профилактики кокцидиоза  
у цыплят-бройлеров и ремонтного молодняка кур

(Организация-разработчик: ООО «ВИК – здоровье животных», 140051, Россия,  
Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, Егорьевское ш., д.3А.)

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мадикокс<sup>®</sup> (Madicox).

Международное непатентованное наименование: мадурамицин.

2. Лекарственная форма: порошок для орального применения.

Мадикокс<sup>®</sup> в 100 г в качестве действующего вещества содержит мадурамицин аммония – 1 г, а в качестве вспомогательного вещества – кальция карбонат до 100 г.

3. По внешнему виду Мадикокс<sup>®</sup> представляет собой микрогранулированный порошок от серого до желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя составляет 4 года с даты производства.

Запрещается применять Мадикокс<sup>®</sup> по истечении срока годности.

4. Мадикокс<sup>®</sup> выпускают расфасованным по 1 кг в двойные полиэтиленовые пакеты, пакеты из бумаги с полиэтиленовым покрытием или пластиковые банки; по 5; 10; 20 и 25 кг в бумажных или полипропиленовых мешках с полиэтиленовым вкладышем. Каждую единицу фасовки снабжают инструкцией по применению.

5. Мадикокс<sup>®</sup> хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°С до 30°С.

6. Мадикокс<sup>®</sup> следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат следует утилизировать в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Мадикокс<sup>®</sup> относится к группе ионофорных кокцидиостатиков.

10. Мадурамицин, являющийся действующим веществом лекарственного препарата, представляет собой продукт ферментации гриба *Actinomadura uumanensis* и относится к группе полиэфирных монокарбокислых ионофорных антибиотиков. Мадурамицин обладает широким спектром антикокцидийного действия, эффективен в отношении *Eimeria tenella*, *E. acervulina*, *E. necatrix*, *E. maxima*, *E. mivati*, *E. brunetti* и других видов кокцидий, паразитирующих у птиц.

Антикокцидийное действие ионофоров обусловлено способностью образовывать липофильные комплексы с щелочными одно- и двухвалентными катионами и переносить их через клеточную стенку паразита, что приводит к нарушению осмотического баланса и гибели простейших.

Мадурамицин практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте птиц и оказывает антикокцидийное действие на слизистой и подслизистой оболочках, выводится из организма преимущественно с пометом.

По степени воздействия на организм Мадикокс<sup>®</sup> относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

## III. Порядок применения

11. Мадикокс<sup>®</sup> применяют с целью профилактики кокцидиоза у цыплят бройлеров и ремонтного молодняка кур.

12. Мадикокс<sup>®</sup> запрещается применять племенной птице, ремонтному молодняку кур старше 16-недельного возраста, курам-несушкам, ввиду его накопления в яйцах.

13. Мадикокс<sup>®</sup> применяют в дозировке 0,5 г на 1 кг корма или 500 г на 1 т корма, что соответствует 5 мг/кг массы птицы по действующему веществу:

- цыплятам-бройлерам с первых дней жизни в течение периода выращивания, за исключением 5 дней перед убоем;

- ремонтному молодняку птиц с первых дней жизни до 16-недельного возраста.

Для обеспечения равномерного распределения препарата Мадикокс<sup>®</sup> в корме 500 г препарата смешивают последовательно с 10 кг комбикорма, затем с 90 кг и оставшимися 900 кг корма.

14. При передозировке лекарственного препарата у птиц может наблюдаться снижение аппетита, уменьшение потребления воды и потеря массы.

15. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.



16. Мадикокс<sup>®</sup> не предназначен для применения беременным и лактирующим животным.

17. Следует избегать пропусков введения очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска очередной дозы, курс лечения возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

18. При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

19. Не допускается одновременное применение лекарственного препарата совместно с другими кокцидиостатиками, а также в течение 7 дней до и после применения тиамулина.

20. Убой птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 5 суток после окончания применения лекарственного препарата. Мясо птиц, вынуждено убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.

#### IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Мадикоксом<sup>®</sup> следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Мадикокса<sup>®</sup> следует избегать прямого контакта с лекарственным препаратом. Все работы с лекарственным препаратом следует проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные очки, респиратор). Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки, рот прополоскать водой.

Пустую тару из-под Мадикокса<sup>®</sup> запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном попадании Мадикокса<sup>®</sup> на кожу или слизистые оболочки его необходимо тотчас смыть водой с мылом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименования и адреса  
производственных площадок  
производителя лекарственного препарата  
для ветеринарного применения.

1) «С&Д Кемикалс Лимитед», 21  
Кинглонг Роад, Пингуин Коунти,  
Джинан Сити, Шандонг, Китай /  
«S&D Chemical Limited», №21,  
Qinglong Road, Pingyin County, Jinan  
City, Shandong, China.

2) «Евроббиофарм Чайна Ко., Лтд»,  
Рум 1609 Б Блок. Голден Бридж,  
Интернешнл Плаза, № 50 Кежи  
Роад, Кси'ан, Китай/«Eurobiopharm  
China Co., Ltd». Room 1609 B Block,  
Golden Bridge, International Plaza,  
No.50 Keji Road, Xi'an, 710065  
China.

Наименование, адрес организации,  
уполномоченной держателем  
регистрационного удостоверения  
лекарственного препарата на принятие  
претензий от потребителя.

ООО «Торговый дом-ВИК»,  
140051, Россия, Московская обл.,  
Люберецкий р-н, п. Красково,  
Егорьевское ш., д.3А, оф.33.

С утверждением настоящей инструкции, утрачивает силу инструкция по  
применению Мадикокса, утвержденная Россельхознадзором 27.08.2010 г.

Номер регистрационного удостоверения: 32-3-14.16-34.16 N17AP-3-0.3/01311